

# PROPUESTA DE BUNDLES PARA PREVENIR LA INFECCIÓN RELACIONADA CON CATÉTERES



## 1 EVALUAR EL PUNTO DE INSERCIÓN DEL CATÉTER

para detectar signos y síntomas de **infección** (eritema, edema, dolor, sensibilidad o supuración, induración, rotura de la piel en el punto de inserción, etc.)

## 2 ELECCIÓN ADECUADA DEL PUNTO DE INSERCIÓN DEL CATÉTER ANTES DE COLOCARLO

como estrategia para **prevenir la infección**: abordaje de parte baja del cuello, por ejemplo, a favor de zona femoral

## 3 ANTISEPSIA DE LA PIEL CON CLORHEXIDINA ALCOHÓLICA AL 2%

con fricción vigorosa tanto en el momento de la **inserción** como posteriormente en las **curas**

## 4 USAR CATÉTERES ANTIMICROBIANOS PARA REDUCIR EL RIESGO DE CLABSI EN PACIENTES EN RIESGO

como los que están en unidades de **cuidados intensivos**

## 5 UTILIZAR APÓSITOS O ESPONJAS IMPREGNADOS CON CLORHEXIDINA EN LOS CATÉTERES DE CORTA DURACIÓN SIN TÚNEL

siempre que la **edad** y la **piel** del paciente lo permitan

## 6 EVITAR EL USO DE SUTURAS

Usar sistemas de fijación sin suturas para la estabilización de los catéteres venosos centrales.

